

TEST

MODULO CACCIATORE DI UNGULATI CON METODI SELETTIVI SPECIALIZZATO NEL PRELIEVO DEL CERVO

- ID 540** Relativamente alla popolazione di cervo dell'Appennino tosco-emiliano (ACATE), quale delle seguenti affermazioni è sbagliata?
- A Il peso medio dei maschi di classe 1 è inferiore ai 60 Kg.
 - B Il peso medio dei maschi di classe 2 è inferiore ai 100 Kg.
 - C Il peso medio dei maschi di classe 2 è superiore ai 60 Kg.
 - D Il peso medio dei maschi di classe 3 è inferiore ai 90 Kg.
- ID 860** Relativamente alla popolazione di cervo dell'Appennino tosco-emiliano (ACATE), quale delle seguenti affermazioni è sbagliata?
- A Il peso medio delle femmine di classe 1 è inferiore ai 60 Kg.
 - B Il peso medio delle femmine di classe 2 è inferiore ai 75 Kg.
 - C Il peso medio delle femmine di classe 3 è superiore ai 90 Kg.
 - D Il peso medio delle femmine di classe 4 è inferiore ai 90 Kg.
- ID 888** Relativamente alla popolazione di cervo dell'Appennino tosco-emiliano (ACATE), quale delle seguenti affermazioni è corretta?
- A La percentuale di gravidanze nelle femmine adulte è di norma superiore al 90%.
 - B La percentuale di gravidanze nelle femmine adulte è di norma inferiore al 90%
 - C La percentuale di gravidanze nelle femmine adulte è di norma inferiore al 70%
 - D La percentuale di gravidanze nelle femmine adulte è di poco superiore al 70%
- ID 1378** Relativamente alla popolazione di cervo dell'Appenninotosco-emiliano (ACATE), quale delle seguenti affermazioni è corretta?
- A La popolazione complessiva stimata nel 2005 è risultata essere di poco superiore ai 2400 capi .
 - B La popolazione complessiva stimata nel 2001 è risultata essere di poco superiore ai 2400 capi .
 - C La popolazione complessiva stimata nel 2001 è risultata essere di poco superiore ai 2600 capi .
 - D La popolazione complessiva stimata nel 2001 è risultata essere di poco superiore ai 2800 capi .
- ID 906** Nella valutazione del trofeo del cervo per quale coefficiente viene moltiplicata la media dei perimetri delle rose in cm?
- A 0,25.
 - B 0,5.
 - C 1.
 - D 2.
- ID 1377** Relativamente alla popolazione di cervo dell'Appennino tosco-romagnolo, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
- A La popolazione complessiva stimata nel 2005 è risultata essere di circa 2200 capi.
 - B La popolazione complessiva stimata nel 2005 è risultata essere di circa 2400 capi.
 - C La popolazione complessiva stimata nel 2005 è risultata essere di circa 2600 capi.
 - D La popolazione complessiva stimata nel 2005 è risultata essere di circa 2800 capi.

TEST

- ID 862** Quale fra le seguenti affermazioni relative ai fattori che influenzano la formazione ed il ciclo dei palchi del cervo, è sbagliata?
- A** Malformazioni di carattere genetico vengono trasmesse alla prole ed hanno carattere definitivo.
 - B** La castrazione o malformazione dei testicoli determina il trofeo a parrucca ed ha carattere definitivo.
 - C** La rottura delle stanghe già "pulite" provoca un temporaneo handicap funzionale.
 - D** Una lesione dello stelo determina una temporanea formazione di cime in soprannumero.
- ID 874** Relativamente al cervo, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
- A** Il peso medio alla nascita è di circa 5 Kg.
 - B** Il peso medio alla nascita è di circa 7 Kg.
 - C** Il peso medio alla nascita è di circa 9 Kg.
 - D** Il peso medio alla nascita è di circa 11 Kg.
- ID 850** Quante sono le popolazioni appenniniche di cervo che interessano l'Emilia Romagna?
- A** 2.
 - B** 3.
 - C** 4.
 - D** 5.
- ID 871** Che cosa determina, nei mesi di luglio-agosto, l'aumento del tasso ematico di testosterone nei maschi di cervo?
- A** L'inizio del periodo riproduttivo.
 - B** La ricrescita dei palchi.
 - C** La completa ossificazione dei palchi.
 - D** La caduta dei palchi.
- ID 869** Quale delle seguenti affermazioni, relative alla caduta dei palchi nei maschi di cervo, è corretta?
- A** Avviene prevalentemente nel mese di febbraio.
 - B** Avviene a partire dalla fine di marzo a tutto aprile.
 - C** Avviene a partire dalla fine di marzo a tutto aprile ed anche (per i più giovani) maggio.
 - D** Avviene a partire dalla fine di febbraio a tutto marzo ed anche (per i più giovani) aprile.
- ID 851** In quale provincia emiliano-romagnola, fra quelle sotto elencate, non è presente il cervo?
- A** Piacenza.
 - B** Modena.
 - C** Forlì-Cesena.
 - D** Bologna.

TEST

- ID 889** Quale dei seguenti parametri non è importante ai fini della predisposizione dei piani di abbattimento di una popolazione di cervo?
- A Entità e densità dei maschi kapital.
 - B Entità e densità della popolazione.
 - C Struttura per classi di sesso ed età.
 - D Incremento utile annuo.
- ID 856** Quale fattore, fra quelli che influenzano la formazione ed il ciclo dei palchi, è più determinante in relazione alla forma dei palchi?
- A Fattori ereditari.
 - B Fattori alimentari.
 - C Tasso ematico di somatotropina.
 - D Fotoperiodo.
- ID 875** Relativamente al cervo, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
- A L'incremento ponderale nei primi due mesi di vita è superiore al 100%.
 - B L'incremento ponderale nei primi due mesi di vita è superiore al 150%.
 - C L'incremento ponderale nei primi due mesi di vita è superiore al 200%.
 - D L'incremento ponderale nei primi due mesi di vita è superiore al 300%.
- ID 903** Nella valutazione del trofeo del cervo quanti punti vengono assegnati alla presenza di un solo ago ma ben sviluppato?
- A 0.
 - B 1.
 - C 1,5.
 - D 2.
- ID 854** Quale importante funzione svolge (ovviamente assieme ad altre) il testosterone nei maschi di cervo alla fine del primo anno di vita?
- A Stimola la crescita dei palchi.
 - B Favorisce l'azione della somatotropina.
 - C Regola la crescita dei palchi.
 - D Stimola la formazione degli steli.
- ID 895** Nella predisposizione del piano di abbattimento di una popolazione di cervo, che percentuale di femmine sottili è bene considerare (sul totale delle femmine)?
- A 10 - 15 %.
 - B 15 - 20 %.
 - C 20 - 25%.
 - D 25 - 30 %.

TEST

- ID 890** **Quale dei seguenti principi e/o obiettivi, si può considerare superfluo ai fini di una corretta organizzazione della gestione venatoria di una popolazione di cervo?**
- A** La determinazione ed eventuale miglioramento della capacità faunistica del territorio.
 - B** La determinazione delle tipologie colturali dell'habitat.
 - C** La determinazione della densità e struttura delle popolazioni.
 - D** Il prelievo venatorio.
- ID 866** **A quale specie e classe di sesso ed età si riferisce la seguente descrizione: “..hanno palchi costituiti da stanghe piuttosto corte e non ramificate, prive di rose e a forma di fuso, che verranno puliti ad agosto del secondo anno di vita e “gettati” ad aprile dell’anno successivo”.**
- A** Ai fusoni di cervo.
 - B** Ai caprioli puntuti.
 - C** Ai fusoni di daino.
 - D** A tutti i maschi giovani dei cervidi.
- ID 849** **Quale sottospecie del Cervus elaphus è presente nell’Appennino settentrionale?**
- A** Cervus elaphus atlanticus.
 - B** Cervus elaphus hispanicus.
 - C** Cervus elaphus hippelaphus.
 - D** Cervus elaphus corsicanus.
- ID 880** **Relativamente ai periodi di attività giornaliera del cervo, quale delle seguenti affermazioni è corretta?**
- A** Sono mediamente 6-8, per un totale di circa 15 ore in inverno e 9 in estate.
 - B** Sono mediamente 9-15, per un totale di circa 6 ore in inverno e 8 in estate.
 - C** Sono mediamente 6-8, per un totale di circa 9 ore in inverno e 15 in estate.
 - D** Sono mediamente 9-15, per un totale di circa 8 ore in inverno e 6 in estate.
- ID 872** **Quale delle seguenti affermazioni relative ai palchi del cervo è sbagliata?**
- A** Il palco di prima testa è costituito dai “fusi”.
 - B** Nel palco di seconda testa sono di norma presenti solo oculare, mediano e vertice.
 - C** Nel palco di seconda testa può manifestarsi già un accenno di ago e inizio di forca.
 - D** Nel palco di prima testa sono presenti gli oculari.
- ID 867** **Quale delle seguenti affermazioni è corretta?**
- A** La ricostruzione dei palchi nei maschi di cervo viene completata in circa sei mesi.
 - B** La ricostruzione dei palchi nei maschi di cervo viene completata in circa cinque mesi.
 - C** La ricostruzione dei palchi nei maschi di cervo viene completata in circa quattro mesi.
 - D** La ricostruzione dei palchi nei maschi di cervo viene completata in circa due mesi.

TEST

- ID 878 In quali stagioni si riscontrano gli spazi vitali del cervo più estesi?**
- A** Primavera ed estate.
 - B** Estate e inverno.
 - C** Autunno e inverno.
 - D** Primavera e autunno.
- ID 885 Quale dei seguenti elementi è di fondamentale importanza ai fini di una corretta gestione faunistico-venatoria del cervo?**
- A** Il monitoraggio periodico dello status delle popolazioni.
 - B** La creazione di campetti con coltivazioni "a perdere".
 - C** La predisposizione di interventi periodici di prevenzione danni.
 - D** La creazione di un adeguato numero di pozze d'acqua.
- ID 902 Nella valutazione del trofeo del cervo per quale coefficiente viene moltiplicata la media della lunghezza di entrambi gli oculari in cm?**
- A** 0,25.
 - B** 0,5.
 - C** 1.
 - D** 2.
- ID 892 Nella predisposizione del piano di abbattimento di una popolazione di cervo, che percentuale di fusoni (sul totale dei maschi) è bene considerare?**
- A** 10 - 20 %.
 - B** 15 - 25 %.
 - C** 20 - 30%.
 - D** 25 - 35 %.
- ID 882 Esistono per il cervo dei momenti giornalieri di sonno profondo (durante i quali l'animale completamente assopito è incapace di percepire gli eventuali pericoli) ?**
- A** No mai.
 - B** Si ma sono brevissimi (al massimo 10 minuti).
 - C** Si ma sono molto brevi (al massimo 30 minuti).
 - D** Si ma sono brevi (al massimo 45 minuti).
- ID 898 Quali delle seguenti affermazioni, relative ai calibri più idonei alla caccia al cervo, è corretta?**
- A** I calibri 280 Remington e 270 Winchester sono adeguati.
 - B** I calibri 280 Remington e 270 Winchester sono insufficienti.
 - C** I calibri 280 Remington e 270 Winchester sono eccessivi.
 - D** I calibri 280 Remington e 270 Winchester sono al limite della sufficienza.

TEST

- ID 859 La denutrizione, le malattie e le parassitosi cruenta, che effetti possono avere sullo sviluppo dei palchi nel cervo?**
- A** Trofeo poco sviluppato accartocciato o deforme.
 - B** Formazione di cime in soprannumero.
 - C** Trofeo a parrucca.
 - D** Palchi poco sviluppati, delocalizzati, pendenti.
- ID 853 Quale elemento dei palchi del cervo viene identificato dalla seguente descrizione: “..sono assenti nella “prima testa” (fusi) in quanto segno del rinnovo annuale dei palchi e divengono sempre più grandi e spesse con l’avanzare dell’età..”**
- A** Le rose.
 - B** Gli steli.
 - C** Le punte.
 - D** Le perle.
- ID 847 In quanti capi è stata stimata la popolazione italiana di cervo nel 2000?**
- A** Circa 24.000 capi.
 - B** Circa 44.000 capi.
 - C** Circa 84.000 capi.
 - D** Circa 140.000 capi.
- ID 879 Relativamente agli spazi vitali del cervo, quale delle seguenti affermazioni è sbagliata?**
- A** In estate le aree utilizzate sono più piccole che in autunno.
 - B** In inverno si assiste alla massima riduzione delle aree utilizzate.
 - C** In inverno si assiste alla massima espansione delle aree utilizzate.
 - D** In estate le aree utilizzate sono più piccole che in primavera.
- ID 855 Quale fra i seguenti fattori che influenzano la formazione ed il ciclo dei palchi, è più determinante in relazione alle dimensioni?**
- A** Fattori ereditari.
 - B** Fattori alimentari.
 - C** Tasso ematico di somatotropina.
 - D** Fotoperiodo.
- ID 852 In quale provincia emiliano-romagnola, fra quelle sotto elencate, il cervo è presente in modo quantitativamente maggiore?**
- A** Reggio Emilia.
 - B** Modena.
 - C** Ferrara.
 - D** Bologna.

TEST

- ID 863** Relativamente al cervo, quale tipologia di malformazione dei palchi viene indicata dalla seguente descrizione: "...sono probabilmente la conseguenza di difficoltà di metabolizzazione dei sali minerali".
- A** Palchi a "cavatappi" o "di gomma".
 - B** Formazione di cime in soprannumero.
 - C** Trofeo a parrucca.
 - D** Palchi poco sviluppati o delocalizzati.
- ID 905** Nella valutazione del trofeo del cervo per quale coefficiente viene moltiplicata la media della lunghezza di entrambi i mediani in cm?
- A** 0,25.
 - B** 0,5.
 - C** 1.
 - D** 2.
- ID 900** Quali delle seguenti affermazioni, relative ai calibri più idonei alla caccia al cervo, è sbagliata?
- A** I calibri 7 mm Rem Mag e 8 mm Rem Mag sono adeguati.
 - B** I calibri 280 Remington e 270 Winchester sono insufficienti.
 - C** I calibri 300 mm Rem Ultra Mag e 7 mm Remington Ultra Mag sono eccessivi.
 - D** I calibri 300 Win Mag e 300 Win Short Mag sono insufficienti.
- ID 873** Relativamente ai palchi del cervo, il numero delle punte è in relazione all'età (una punta in più per ogni anno trascorso)?
- A** Sì ma solo fino al quarto anno di vita.
 - B** Sì ma solo nelle popolazioni alpine.
 - C** Sì ma solo fino al quinto anno di vita.
 - D** No.
- ID 891** Nella predisposizione del piano di abbattimento di una popolazione di cervo, che percentuale di piccoli dell'anno è bene prevedere di prelevare?
- A** 20 - 25 % di maschi, 25 - 35 % di femmine.
 - B** 20 - 25 % di femmine, 25 - 35 % di maschi.
 - C** 20 - 25 % di maschi, 20 - 25 % di femmine.
 - D** 25 - 35 % di maschi, 25 - 35 % di femmine.
- ID 894** Nella predisposizione del piano di abbattimento di una popolazione di cervo, che percentuale di maschi subadulti (3-4 anni) è bene considerare (sul totale dei maschi)?
- A** 10 - 15 %.
 - B** 15 - 20 %.
 - C** 20 - 25%.
 - D** 25 - 30 %.

TEST

- ID 884 Relativamente al cervo, quale delle seguenti affermazioni è sbagliata ?**
- A** La densità biotica massima del cervo è di 6 - 10 capi per km².
 - B** La densità biotica media del cervo è di 7 - 8 capi per km².
 - C** La densità agroforestale massima del cervo è di 6 - 7 capi per km².
 - D** La densità biotica minima del cervo è di 0,5 - 1 capo per km².
- ID 861 Una eventuale lesione del velluto, che effetti può avere sullo sviluppo dei palchi nel cervo?**
- A** Trofeo poco sviluppato accartocciato o deforme.
 - B** Formazione di cime in soprannumero.
 - C** Disturbi della crescita e della morfologia del palco.
 - D** Palco poco sviluppato, delocalizzato, pendente.
- ID 896 Nella predisposizione del piano di abbattimento di una popolazione di cervo, che percentuale di femmine adulte è bene considerare (sul totale delle femmine)?**
- A** 25 - 30 %.
 - B** 35 - 40 %.
 - C** 45 - 50%.
 - D** 50 - 55 %.
- ID 881 Quanto dura mediamente ogni periodo di attività giornaliera del cervo ?**
- A** Circa 30 minuti.
 - B** Circa 60 minuti.
 - C** Meno di 60 minuti.
 - D** Circa 90 minuti.
- ID 858 Relativamente al cervo, la rottura delle stanghe durante la ricrescita dei palchi che effetti può avere?**
- A** Trofeo poco sviluppato.
 - B** Formazione di cime in soprannumero.
 - C** Trofeo a parrucca.
 - D** Trofeo "pendente".
- ID 865 Il fotoperiodo (rapporto fra lunghezza del giorno e della notte) è un fattore che influenza la formazione ed il ciclo dei palchi del cervo?**
- A** Sì perché quando aumenta la luce aumentano anche le risorse alimentari.
 - B** Sì perché quando diminuisce la luce aumenta il freddo.
 - C** Sì perché su stimolo della luce aumenta la produzione ormonale.
 - D** Sì perché su stimolo della luce diminuisce la produzione ormonale.
- ID 883 Relativamente al cervo, quale delle seguenti affermazioni è corretta ?**
- A** La densità biotica minima del cervo è di 8 - 10 capi per km².
 - B** La densità biotica minima del cervo è di 6 - 8 capi per km².
 - C** La densità biotica minima del cervo è di 2 - 4 capi per km².
 - D** La densità biotica minima del cervo è di 0,5 - 1 capo per km².

TEST

- ID 877** Relativamente all'estensione degli spazi vitali del cervo, quale delle seguenti affermazioni è corretta?
- A** Quelli dei maschi sono grandi circa il doppio di quelli delle femmine.
 - B** Quelli delle femmine sono grandi circa il doppio di quelli dei maschi.
 - C** L'estensione degli home ranges maschili e femminili è pressoché identica.
 - D** I giovani fino ai due anni occupano aree diverse da quelle degli adulti.
- ID 893** Nella predisposizione del piano di abbattimento di una popolazione di cervo, che percentuale di maschi adulti (oltre i 4 anni) è bene considerare (sul totale dei maschi)?
- A** 10 - 15 %.
 - B** 15 - 20 %.
 - C** 20 - 25%.
 - D** 25 - 30 %.
- ID 848** In quante delle 103 province italiane è attualmente presente il cervo?
- A** 17.
 - B** 27.
 - C** 47.
 - D** 67.
- ID 887** Qual è il primo dovere dell'aspirante cacciatore di selezione al cervo?
- A** Dotarsi di tutta la necessaria strumentazione ottica.
 - B** Acquisire le nozioni e l'esperienza per effettuare correttamente gli interventi di prelievo.
 - C** Dotarsi delle armi più appropriate.
 - D** Acquisire le nozioni e l'esperienza per effettuare correttamente le operazioni di evisceramento.
- ID 876** L'estensione degli spazi vitali (Home Ranges) del cervo varia in funzione di molti parametri, quale fra i seguenti non riveste alcuna importanza?
- A** Tipologie ambientali in cui vive la popolazione.
 - B** Periodo dell'anno.
 - C** Dimensioni corporee degli individui.
 - D** Sesso degli individui.
- ID 870** Quando inizia la ricrescita dei palchi nuovi nei maschi di cervo?
- A** Pochi giorni dopo aver "gettato" i vecchi.
 - B** Molti giorni dopo aver "gettato" i vecchi.
 - C** Alcune settimane dopo aver "gettato" i vecchi.
 - D** Circa un mese dopo aver "gettato" i vecchi.
- ID 899** Per disposizione di legge, quali tipologie di armi possono essere utilizzate nella caccia al cervo?
- A** Armi a canna rigata o liscia purché del calibro consentito.
 - B** Armi a canna liscia con munizione spezzata.
 - C** Armi a canna liscia con proiettili unici.
 - D** Esclusivamente armi a canna rigata del calibro consentito.

TEST

- ID 907** Nella valutazione del trofeo del cervo per quale coefficiente viene moltiplicato il peso espresso in grammi?
- A** 0,25.
 - B** 0,5.
 - C** 1.
 - D** 2.
- ID 901** Nella valutazione del trofeo del cervo per quale coefficiente viene moltiplicata la media della lunghezza delle due stanghe in cm?
- A** 0,25.
 - B** 0,5.
 - C** 1.
 - D** 2.
- ID 908** Nella valutazione del trofeo del cervo, per attribuire il punteggio all'apertura, con quale altra misura viene messa in relazione?
- A** La lunghezza media degli oculari.
 - B** La lunghezza media delle stanghe.
 - C** La lunghezza media dei mediani.
 - D** Il peso del trofeo in grammi.
- ID 886** Quali tipologie di caccia si possono praticare per effettuare prelievi di cervo?
- A** La caccia di selezione, la braccata e la battuta.
 - B** La caccia di selezione e la girata.
 - C** Esclusivamente la caccia di selezione.
 - D** La caccia di selezione e la battuta.
- ID 857** Quale importante ormone fra quelli elencati, assieme ad altri, stimola e regola la crescita dei palchi nei cervidi?
- A** Gli estrogeni.
 - B** Il testosterone.
 - C** la somatotropina.
 - D** Il progesterone.
- ID 904** Nella valutazione del trofeo del cervo quanti punti vengono assegnati alla presenza di entrambi gli aghi ben sviluppati?
- A** 0.
 - B** 1.
 - C** 1,5.
 - D** 2.

TEST

- ID 864** **A partire da 9-10 mesi di età (Marzo-Aprile dell'anno successivo alla nascita) quale evento si verifica nei giovani maschi di cervo?**
- A** Perdono la pomellatura del mantello.
 - B** Sostituiscono il terzo premolare da latte con quello definitivo.
 - C** Gettano i primi palchi.
 - D** Iniziano la costruzione dei primi palchi.
- ID 868** **Quale dei seguenti criteri di valutazione non è importante nella discriminazione di un maschio adulto di cervo rispetto ad un subadulto?**
- A** La grossezza delle stanghe e il grado di apertura del trofeo.
 - B** Lo sbilanciamento di peso e mole verso i quarti anteriori.
 - C** La presenza o meno dell'ago.
 - D** La struttura fisica e le dimensioni dell'animale.
- ID 897** **Quali sono le armi più idonee ad effettuare la caccia di selezione al cervo?**
- A** Le armi a leva.
 - B** Le carabine "bolt action".
 - C** Le armi semiautomatiche.
 - D** Le armi a pompa.